



Kundeninformation

Einkürzung Winterraps

Niederschläge in den vergangenen Tagen haben vielerorts für einen Wachstumsschub der Rapsbestände gesorgt. Erste Bestände haben bereits das 4-Blatt-Stadium erreicht. In der Regel haben früh gedrillte Bestände mehr Zeit für ihre Vorwinterentwicklung. Dies bedingt einen angepassten Wachstumsreglereinsatz, um ein Überwachsen der Bestände im Herbst und damit die Auswinterungsgefahr zu reduzieren. Ziel ist ein Wurzelhalsdurchmesser von 0,8-1,0 cm vor dem Winter. Insbesondere die weit entwickelten Rapsbestände benötigen eine gute und rechtzeitige Einkürzung, um vor Winter nicht zu überwachsen und schließlich auszuwintern. Bei besonders wüchsigen Beständen sollte ggf. eine Splittingmaßnahme erfolgen. Produktwahl und Aufwandmengen orientieren sich dabei an der Wüchsigkeit des Rapses sowie an der Anfälligkeit gegenüber Phoma. Zu beachten ist weiterhin, dass keine Metconazol-haltigen Produkte im Herbst eingesetzt werden dürfen, wenn die Unkrautbekämpfung mit Belkar oder LaDiva erfolgt.



RPL Tipp: Zur Erfolgskontrolle ist das Anlegen eines Spritzfensters ratsam.

Empfehlung zum Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz im Raps: 1 geplante Maßnahme / normal / langsam entwickelter Raps

Kürzungsleistung



0,3–0,4 l/ha **Toprex** (NW 605: 75% = *)

0,5–1,0 l/ha **Carax** (NW609-1: 75 % = *)

1,0–1,4 l/ha **Architect** + 0,6–0,8 l/ha **Turbo** (NW607-1: 90 % = 5 m, NT140)

0,5–1,0 l/ha **Lynx** (Tebuconazol) (NW605: 90 % = 5 m, NW701, NT101)

0,7–1,0 l/ha **Tilmor** (NW 605: 90% = *, NW 701)





Empfehlung zum Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz im Raps: 2 geplante Maßnahmen / früh gedrillter, zügig entwickelter Raps	
BBCH 14	0,5 l/ha Lynx (Tebuconazol) (NW605: 90 % = 5 m, NW701, NT101) 0,5 l/ha Carax (NW609-1: 75 % = *)
BBCH 16-18	0,8 l/ha Tilmor (NW605: 90 % = *, NW701) 0,3-0,4 l/ha Toprex (NW605: 75 % = *)

Blattdüngung Herbst im Raps

Um die Vorwinterentwicklung zusätzlich positiv zu beeinflussen, kann zusammen mit der Fungizidmaßnahme eine Blattdüngung erfolgen. Zur Gesunderhaltung und effizienten Absicherung der Winterhärte ist die Mikronährstoffversorgung essenziell. Drei Elemente sind hierbei besonders wichtig – Bor, Mangan und Molybdän.

Empfehlung zur Blattdüngung Herbst im Raps	
Mehrnährstoffdünger	1,0–2,0 kg/ha Canolan 1,5–2,0 l/ha Phomazin
Bor	1,0–2,0 l/ha Lebosol Bor 150 1,5 l/ha TradeborMo

Bei Fragen zu Details sprechen Sie Ihren Kundenbetreuer gerne an.

Hinweis: Bei allen Pflanzenschutzmaßnahmen müssen die aktuelle Zulassung und insbesondere die Abstandsauflagen beachtet werden. Die Produktbeschreibung als Beipackzettel ist vor dem Einsatz der Pflanzenschutzmittel durchzulesen und zu beachten, die unterschiedlichen Auflagen der Bundesländer sind zu berücksichtigen.

