




Kundeninformation

Einsatzzeitpunkt Minecto Gold/ Exirel

In diesem Jahr war der Zuflug des Rapsdflfloh nicht unerheblich. Beispielhaft für den Standort Bäk (23909, SH) begann der Zuflug bereits in der ersten Septemberwoche. Ab dem 09. September wurde die Schadschwelle des Fraßschadens von > 10 % zerfressender Blattfläche gerissen und der Fang in den Gelbschalen ist stark angestiegen.

Nach Tagen des Reifungsraßes konnte beobachtet werden, dass die Tagaktivität um den 23. September zugenommen hat. Ab diesem Zeitpunkt ist nicht nur aufgrund unserer Beobachtungen, sondern auch anhand der Temperatursumme (Summe seit Zuflug > 300 °C) davon auszugehen, dass die Eiablage langsam begonnen hat. Am 7. Oktober waren bereits erste kleine Larven (L1-Stadium, 3 mm groß) in den Blattstielen sichtbar. Die Niederschläge der vergangenen Woche haben die Eiablage begünstigt.

Wann ist der richtige Einsatzzeitpunkt von Minecto Gold/ Exirel?



09.09.25



07.10.25

Beispiel am Standort Bäk. SH

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass mit einer Eiablage insbesondere bei milden Wintern bis ins Frühjahr hinein zu rechnen ist, weshalb die teilsystemischen Produkte Minecto Gold/ Exirel nicht zu früh gegen die Larven angewendet werden sollten. Eine zu späte Applikation kann hingegen dazu führen, dass die Larven bereits zu groß sind und damit die Bekämpfungsleistung sinkt.





Das Einsatzfenster ist schwer definierbar und je nach Region, Befall und Fläche unterschiedlich. Der ungefähre Applikationszeitpunkt liegt zwischen Ende Oktober und Anfang November. Um die Wirkungsgrade zu verbessern, sollte bereits im Vorfeld auf folgende Punkte geachtet werden:

- Gut entwickelte Bestände sind grundsätzlich robuster gegenüber den Auswirkungen des Larvenbefalls, jedoch wird bei wüchsigem Raps mit aufrechtstehenden Blättern das Benetzen bzw. das Eindringen der Spritzbrühe erschwert. Durch gezielte Wachstumsreglermaßnahmen kann dafür gesorgt werden, dass die Blattstiele möglichst flach auf dem Boden liegen.
- Das Hinzufügen von 1,0 l/ha Hasten o.ä. verbessert die Benetzung.
- Volle Aufwandmengen applizieren, um eine möglichst lange Dauerwirkung zu erhalten.
- Möglichst zum Vegetationsende applizieren.
- Eine Applikation zusammen mit Propyzamid (z.B. Kerbflo) ist nicht ratsam, da sich die optimalen Anwendungsbedingungen deutlich voneinander unterscheiden.

Schadsschwellen sind zu beachten

Geschwächte Bestände: 3 Larven/ Pflanze

Gut entwickelte Bestände: 5 Larven/ Pflanze

Empfehlung Insektizide zur Bekämpfung von Rapsdelflohlarven im Winterraps

- 0,1875 kg/ha Minecto Gold
- 0,4 l/ha Exirel

